

## **Bilateral Pudendal Perineuronal Injection Post Procedure Instructions**

### **陰部兩側周圍神經注射治療後指引**

術後 48 小時內有些人可能有感到麻痺、無法解尿及雙腿無力情形，甚至要以輪椅代步出院，這根據各人情況不同而有所不同。

若無法解尿則返家前會放置導尿管，護理人員會教你如何在術後 24 小時後自行拔除導尿管的方法。

極少數的人可能會出現暫時性的大小便失禁。

在回診評估前，切勿進行性行為。

隔天可回工作崗位而無負重限制。

### **如有以下情況請致電查詢：**

1. 下肢麻痺無力超過 48 小時。
2. 無法解尿。
3. 在服用醫囑藥物後疼痛不適無法緩解。
4. 體溫 > 攝氏 38°C，即華氏 100.5°F 時。

若有發燒或疼痛，可服醫師給予的止痛退熱藥物，或按 **Diclofenac** , **Ibuprofen** 等止痛藥包裝指示服用之。

工作人員會為你預約回診日期，請按時回診。

## **風險**

所有手術都有其風險，本治療有如其手術般有潛在出血、器官創傷及感染的危險性，若有發生合併症則視需要執行進一步的治療程序或手術。

Updated February 15, 2014